

Родителям о вакцинации



Қарағанда, ноябрь 2017 год

От чего и как надо прививать

Дети - это наша главная награда! И вы, как родители, должны сделать для них все возможное - растить их и защищать их от зла.

Каждая страна имеет свой утвержденный Национальный Календарь прививок и перечень инфекционных заболеваний, против которых прививается население. И чем богаче страна, тем шире этот перечень. Казахстан также имеет свой утвержденный постановлением Правительства Календарь прививок, который приводится ниже.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ИПЦСЭЭИМ АГЕНТСТВА РК ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОЗРАСТ	ВИДЫ ВАКЦИНАЦИИ							
	БЦЖ	ВГВ	ОПВ/ ИПВ	АБКДС	Хиб	АДС-М	ККП	Пневмо
1-4 день жизни	+	+						
2 месяца		+ (АБКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)						+
3 месяца			+ (АБКДС+Хиб+ИПВ)					
4 месяца		+ (АБКДС+Хиб+ВГВ+ИПВ)						+
12-15 месяцев			+(ОПВ)				+	+
18 месяцев			+ (АБКДС+Хиб+ИПВ)					
6 лет (1 класс)	+			+			+	
16 лет						+		
Через каждые 10 лет						+		

МОНОВАКЦИНЫ:
АДС-М – против дифтерии, столбняка
БЦЖ – против туберкулеза
Пневмо – против пневмококковой инфекции
ВГВ – против вирусного гепатита В
ОПВ / ИПВ – против полиомиелита – оральная/инактивированная

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ:
ККП – против кори, краснухи, эпидемического паротита
АБКДС+ВГВ+Хиб+ИПВ – против коклюша (с бесклеточным коклюшным компонентом), дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита

nadezhda.kz

Распространяется бесплатно. Отпечатано в ТОО ЖИЦ "Семин". Тираж 18000

Вакцина против гепатита В

Гепатит В - это вирус, который поражает печень. Каждый год диагностируется около 2500 новых случаев гепатита В. Большинство людей, которые заражаются вирусом гепатита В, не имеют каких-либо симптомов. Некоторые из них жалуются на потерю аппетита, тошноту, рвоту, усталость и желтуху (пожелтение кожи и глаз).

Вирус гепатита В может также вызвать быструю разрушающую инфекцию печени, длительное заболевание печени, называемое циррозом, и рак печени. Действительно, маленькие дети, инфицированные вирусом гепатит В, более склонны к развитию цирроза печени, чем дети старшего возраста и взрослые. Каждый год тысячи людей умирают от осложнений вирусных инфекций гепатита В



Вакцина против туберкулеза - БЦЖ

Туберкулез — наиболее распространенная инфекция. По данным ВОЗ треть населения Земли (более 2 млрд человек) заражено туберкулезом. Ежегодно в мире регистрируется около 4 млн новых случаев заболевания и около 3 млн людей умирают от данной инфекции.

Туберкулез передается бактериями, попадающими в воздух от больного при кашле, чихании или разговоре. Наиболее частая локализация туберкулеза - легкие, где он встречается в 90% всех случаев. Кроме того, туберкулез поражает и другие органы, в первую очередь кости, суставы, кожу, почки, мозг. Основными признаками туберкулеза являются длительный кашель, общая слабость, потеря веса, озноб (лихорадка), повышенная потливость.



Вакцина против дифтерии

«Д» в **АБКДС** означает дифтерию. Дифтерия вызывается бактерией, которая обычно поражает детей и подростков.

Бактерия вызывает образование толстого налета на задней стенке горла, что затрудняет дыхание и глотание. Кроме того, бактерия вырабатывает вредный белок (токсин), который может проникать в сердце почки и нервную систему. Примерно один из каждых 20 детей, зараженных дифтерией, умирают от удушья, сердечной недостаточности или паралича.

Дифтерия является очень заразной и распространяется при кашле и чихании.



Вакцина против столбняка

«С» в **АБКДС** означает столбняк. Столбняк – это бактерии, которые, как правило, поражают пожилых людей.

Бактерия столбняка вырабатывает токсин, который вызывает сильные болезненные спазмы мышц, включая мышцы челюсти (Столбняк называют «спазмом жевательной мышцы»).

Иногда столбняк может привести к смертельному исходу. Мышечные спазмы горла могут блокировать трахею и вызвать мгновенную смерть от удушью. Токсин столбняка может также вызвать серьезные и необратимые повреждения сердца. Примерно трое из каждых десяти людей, заразившихся столбняком, умирают от этого заболевания.



Вакцина против коклюша

«К» в **АБКДС** означает коклюш. Коклюш (**лающий кашель**) – это бактерия, которая инфицирует младенцев, детей, подростков и взрослых и взрослых. Бактерия коклюша вырабатывает несколько токсинов, которые вызывают у детей развитие густой, липкой слизи, забивающей трахею и вызывающей болезненные спазмы кашля. Когда ребенок вдыхает через суженную трахею, это вызывает судорожный шумных звук, поэтому коклюш также известен как «лающий кашель».

Спазмы кашля затрудняют дыхание детей, мешают им есть и пить. Бактерия коклюша может также вызвать пневмонию, припадки и необратимое повреждение головного мозга.



Вакцина против гемофильной инфекции типа В (Hib)

Гемофильная инфекция типа В (Hib) вызывается бактерией, которая обычно поражает младенцев и маленьких детей. Hib вызывает **менингит**, инфекцию кровотока и пневмонию.

Примерно один из каждых пяти дней, которые выживают после менингита, вызванного Hib, остаются умственно отсталыми, глухими, слепыми или имеют трудности с обучением.

Пневмококковая вакцина

Пневмококк – это бактерия, которая является наиболее распространенной причиной тяжелых бактериальных инфекций новорожденных и детей младшего возраста во всем мире.

Тяжелый инфекции включают **менингит** (инфекцию оболочки головного мозга и спинного мозга), инфекцию легких).

Пневмококк также является распространенной причиной ушных инфекции и инфекций носовых пазух.



Вакцина против полиомиелита

Полиомиелит вызывается вирусом, который обычно поражает детей. Полиомиелит, как правило, вызывает легкую кишечную инфекцию. Однако примерно один из каждых 100 человек, инфицированных вирусом полиомиелита, будет необратимо парализован, когда вирус заразит мозг или спинной мозг. Как правило, полиомиелит вызывает паралич рук и ног. Но иногда полиомиелит вызывает паралич мышц, задействованных при дыхании.

Полиомиелит передается через руки в рот, и очень заразен.

Вакцина против кори-краснухи-паротита-(ККП)

Паротит – это вирус, который, как правило, поражает детей и вызывает болезненную припухлость желез, расположенных чуть ниже уха(околоушных желез).

Паротит также заражает оболочку головного мозга и спинного мозга (менингит) и может привести к необратимой потере слуха.

Паротит может также заразить будущего ребенка в первом триместре беременности и вызвать гибель плода.



Вакцина против кори-краснухи-паротита-(ККП)

Корь - это вирус, который. Как правило, поражает маленьких детей. Дети, инфицированные корью, имеют такие симптомы как кашель, насморк, лихорадка, конъюнктивит и сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальные части тела. Вирус кори может также поражать легкие, вызывая пневмонию, и головной мозг, вызывая необратимое поражение мозга или смерть.

Корь является очень заразной и распространяется при кашле и чихании.

Краснуха (германская корь)

Краснуха – это вирус, который, как правило, поражает детей и вызывает набухание желез за ухом, небольшую сыпь и лихорадку. Краснуха, как правило, протекает в легкой степени у маленьких детей. Однако когда женщина заражается вирусом краснухи во время беременности, вирус может вызвать необратимые, тяжелые врожденные дефекты или выкидыш.



Дорогие родители!

Вакцинация против инфекционных заболеваний – самый надежный, эффективный метод защиты населения, как детей, так и взрослых. Правильно привитый ребенок и взрослый защищены от инфекций. Ученые мира доказали, что альтернативы профилактическим прививкам в настоящее время не существует. Защитите себя, своих детей от заболеваний!

Для здравомыслящих и благоразумных родителей нет и не может быть никакой дискуссии по поводу того, надо прививки делать или нет.

Делать обязательно!

Администрация ТОО «ГЦ ПМСП»

Исполнитель: главный специалист по педиатрии Татанова Мариям Кумысбековна